


Výskyt ochorenia na OSÝPKY, očkovanie proti tejto infekcii



Príznaky ochorenia:

- **Prodromálne štádium**: zvýšená teplota, nádcha, pokašliavanie a prekrvenie očných spojoviek, s typickým vzhľadom „uplakaného dieťaťa“
- **exantémové štádium** - exantém (vyrážky) vzniká za ušnými boltcami a na záhlaví, počas 4 dní sa postupne vysieva na celý trup a končatiny. V dutine ústnej sú afty, pery sú popraskané, jazyk povlečený.
- **Časté komplikácie** - zápal stredného ucha, ťažký zápal pľúc, zápal mozgu, ktoré končili smrteľne.

Ťažší priebeh mali ochorenia u dospelých osôb - dochádzalo k poškodeniu pečene, srdcového svalu a obličiek



- Prameňom nákazy je vždy chorý človek.
- K prenosu nákazy dochádza kontaminovaným vzduchom pri priamom styku s chorým, ale aj nepriamo čerstvo kontaminovanými predmetmi.



- Pred zavedením povinného očkovania proti osýpkam v roku 1969 boli na Slovensku zaznamenávané tisíce prípadov ochorení ročne, skomplikovalo sa 15% ochorení, hospitalizáciu si vyžiadalo 20% prípadov, boli zaznamenávané aj úmrtia.
- Po zavedení očkovania klesla chorobnosť aj v našich okresoch. V roku 1978 bolo z našich okresov ešte hlásených 280 prípadov ochorenia s postupným poklesom výskytu. V roku 1998 boli hlásené posledné prípady ochorenia a od roku 1999 je výskyt vďaka očkovaniam v našom regióne aj na Slovensku nulový.

Schéma očkovania proti osýpkam:

- 1. dávka - od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života
- 2. dávka - v 11. roku života



Krajiny s nepovinným očkovaním - lokálne epidémie

- V priebehu roka 2010 boli zaznamenané a stále prebiehajú početné epidémie v **Bulharsku, Taliansku, Grécku a Nemecku**. Celkovo sa zistilo už takmer 25 000 ochorení, z ktorých sa až 23 791 vyskytlo v Bulharsku. Mnohé ochorenia boli sprevádzané ťažkými komplikáciami, ako je zápal mozgu alebo zápal pľúc. **Doteraz na osýpky zomrelo až 24 osôb**. Najviac postihnuté sú deti a mladiství vo veku do 18 rokov, aj keď ochorenie sa šíri aj medzi dospelé neočkované osoby. Až 90 % chorých nebolo chránených proti osýpkam očkovaním.
- Zvýšená migrácia neočkovaných osôb predstavuje riziko šírenia tohto ochorenia.

Napriek tomu, že na Slovensku je dlhodobo vysoká úroveň zaočkovanosti, riziko zavlčenia osýpok a ich šírenia medzi neočkovanými osobami nie je vylúčené.